DLP 13-4-82960812

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



PUBLICATION PERIODIQUE
BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES - VIENNE
Deux-Sèvres

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, ROUTE DE LA FORET - BIARD - 86 000 POITIERS TEL (49) 58 39 02

BULLETIN N° 2 du 8 AVRIL 1982

JAUNISSE NANISANTE

Cette maladie à virus transmise par les pucerons a eu des conditions très favorables cet hiver. De nombreuses cultures d'orge d'hiver sont gravement atteintes. Les orges de printemps sont à protéger soigneusement dès l'arrivée des premiers pucerons si on veut éviter des dégâts identiques.

POUR LES BLES, les semis d'octobre subiront sans doute des chutes de rendement, mais les dégâts sont peu visibles avant l'épiaison.

Il faut rappeler que les contaminations des céréales d'hiver ont eu lieu au cours de l'hiver. Les plantes au stade montaison sont pratiquement résistantes et sauf infestation de pucerons très forte, les traitements insecticides sont inutiles actuellement.

PUCERONS SUR EPIS

Des infestations de pucerons seront à craindre sur épis cette année, si leurs ennemis naturels ne les détruisent pas avant épiaison. De toutes façons, le stade idéal de traitement se situe à l'épiaison : les traitements plus précoces ne font que perturber l'action des insectes auxiliaires, et n'empêchent pas les réinfestations sur épis.

MALADIES DU PIED ET DU FEUILLAGE


Le piétin-verse a nettement évolué et actuellement 80 % des parcelles sont touchées par cette maladie, avec des attaques graves surtout en terres rouges (30 % des parcelles) et terres de brandes ou bornais (40 % des parcelles).

OBSERVEZ VOS PARCELLES : un traitement au stade 2 noeuds sera encore parfaitement efficace sur le piétin-verse.

Les maladies du feuillage ont évolué très lentement jusqu'à présent. Le temps plus chaud accélère le développement des épidémies, en particulier pour l'oïdium sur variétés sensibles (Cocagne, Hardi, Talent ...). Si le temps est humide, on assistera à l'apparition de taches de septoriose (contaminations de mi-Mars).

SI UN TRAITEMENT EST NECESSAIRE, CHOISISSEZ UN PRODUIT ADAPTE A VOTRE PROBLEME. REPORTEZ-VOUS A LA NOTE TECHNIQUE N° 4 .

Imprimé à la Station le 8 Avril 1982
Précédente Note : N° 1 du 25.3.82



Imprimerie de la Station Poitou-Charentes - Directeur-Gérant : R. GUILLEMENET - Inscription à la C.P.P.A.P. N° 1648 AD